

	Ново-народжений	6 т.	2 м.	4 м.	6 м.	9 м.	12 м.	18 м.	2 р.	4 р.	6 р.	12-13 р.	16 р.	Дорослі (≥ 18 р.)	
Гепатиту В			1 доза	2 доза	3 доза	4 доза									
Туберкульозу		Раніше не вакцинованим: віком понад 6 міс., при негативному результаті РМ													
Кашлюка, дифтерії, правця (КДП)/дифтерії, правця (ДП)			1 доза	2 доза	3 доза	4 доза			ДП			ДП	ДП кожні 10 років		
Поліомієліту			1 доза (ІПВ)	2 доза (ІПВ)	3 доза (ІПВ)	4 доза (ІПВ)			(ІПВ)						
НІВ-інфекції			1 доза	2 доза	3 доза	4 доза									
Кору, епідемічного паротиту, краснухи							1 доза			2 доза					
Папіломавірусної інфекції												1 доза	≥ 15р. 3 дози:0-1-6 міс.		
Пневмококової інфекції			1 доза	2 доза	2 доза					Синфлорикс					
										Превенар 13					
Ротавірусної інфекції			1 доза	2 доза		Ротарикс: вакцинація має бути проведена до 24 тижнів життя									
			1 доза	2 доза	3 доза		Ротатек: вакцинація має бути проведена до 32 тижнів життя								
Менінгококової інфекції	Німенрикс		1 доза	2 доза			3 доза								
	Менактра				9-23 міс.: 2 дози з інтервалом 3 міс.				15-55 р., якщо після попередньої дози мін. 4 р. - одноразово						
Вітряної віспи						1 доза	Ввести 2-гу дозу після 6т. після 1-ї дози (але не раніше 4т. від введення 1 дози)								
Гепатиту А							1 доза	Ввести 2-гу дозу після 6 міс.							
Жовтої лихоманки					6-12 м. не рекомендовано за винятком особливих ситуацій			1 доза (ВООЗ: ревакцинація не проводиться)							
Кліщового енцефаліту						3 дози. Перша ревакцинація через 3 роки; наступні кожні 5 р. від першої ревакцинації									
Червоного тифу									1 доза. Ревакцинація кожні 3 р, якщо є ризик захворювання						
Грипу					Вперше в житті 2 дози з інт. 28 днів, надалі 1 доза щороку						1 доза щороку				